

*De nombreuses espèces d'Afrique, actuellement en danger ou menacées par le commerce de la viande de brousse, sont en voie d'extinction. C'est le cas par exemple du pangolin géant et des grands singes. Des espèces autrefois très répandues sont devenues rares et ont déjà disparu de certaines régions.*

### Facteurs contribuant à la mise en danger d'une espèce par

#### la chasse commerciale:

- réduction de l'habitat
- habitat situé à proximité d'agglomérations urbaines
- petites populations
- poids supérieur à 4 kg
- taux de reproduction très lent
- progéniture peu nombreuse
- phase de développement longue
- concentration sur certains espaces vitaux/sources d'alimentation
- absence de structure sociale, densité de population faible
- activité diurne
- vie au sol
- comportement repérable (bruyant, par exemple) et déplacement très lent

Les espèces de grande taille ou facilement repérables sont les premières victimes. **La plupart sont des ongulés et des rongeurs.** En Guinée-Équatoriale, les rongeurs représentent 32% de l'offre; au Liberia, les céphalophes constituent 75% du gibier vendu.



*Céphalophe à front noir pris dans un collet.*

**Les céphalophes** (antilopes de forêt) paient un des plus lourds tributs au commerce du gibier. Ils sont généralement capturés à l'aide de collets ou de filets. On estime que leur population reste stable en dépit de la chasse intensive dont ils font l'objet, ce qui ne signifie pas pour autant que les méthodes actuelles perdureront. **En Guinée-Équatoriale, le nombre de céphalophes d'Ogilby abattus est deux fois supérieur au taux acceptable, au Cameroun, il est onze à treize fois supérieur.** Le nombre de céphalophes bai abattus ici est également 9 fois supérieur à ce qui serait possible à long terme. Le céphalophe bleu, qui vit en couple, est devenu très rare.




*Famille d'okapis*

Les **okapis** ne figurent pas parmi les principales victimes du commerce de gibier, pourtant, **leur population de 6 000 à 10 000 individus seulement ne peut résister à une chasse intensive.** Les okapis vivent principalement dans la forêt d'Ituri, au nord-est de la RD Congo, où fut créée en 1992 une réserve naturelle d'okapis sur 13 000 km<sup>2</sup>. Au milieu des années 90, celle-ci fut classée patrimoine naturel mondial par l'IUCN. Depuis que la guerre a éclaté en RD Congo, la viande et la fourrure d'okapis ont fait une forte apparition sur les marchés.



*Léopard*



*Colobe guéréza*



*Bongo*



*Hippopotame*

Les **hippopotames** font partie des cibles préférées pour le commerce du gibier. Dans certaines régions, ils menacent de s'éteindre. **Entre 1990 et 1997 dans la seule région du nord du Parc de Virunga (RDC), 7 500 individus (75% de la réserve locale) ont été abattus pour leur viande.**

Chimpanzés  
 Bonobo  
 Gorille  
 Drill  
 Mandrill  
 Cercopithèque de Preuss  
 Cercopithèque de sclater  
 Cercopithèque à queue de soleil  
 Cercopithèque à tête de hibou  
 Cercopithèque de brazza  
 Cercopithèque hocheur  
 Cercopithèque pogonias  
 Cercopithèque de Diane  
 Moustac à oreilles rousses  
 Cercopithèque à ventre rouge  
 Moustac  
 Guéréza noir  
 Colobe Guéréza  
 Mangabey à joues grises  
 Colobe ferrugineux  
 Éléphant de forêt d'Afrique  
 Hippopotame  
 Okapi  
 Buffle d'Afrique  
 Céphalophe zébré  
 Céphalophe d'Ogilby  
 Céphalophe noir  
 Céphalophe bai  
 Céphalophe à front noir  
 Céphalophe de Jentink  
 Céphalophe bleu  
 Céphalophe à dos jaune  
 Céphalophe à ventre blanc  
 Céphalophe de Peters  
 Bongo  
 Sitatunga  
 Tragulidé  
 Potamochère  
 Hylochère  
 Léopard  
 Chat doré  
 Civette  
 Pangolin géant  
 Crocodile nain